


Fondazione
Regionale
per la
Ricerca
Biomedica



www.citomegalovirus.online

Per saperne di più chiedi al tuo medico e visita il sito:

Igiene e comportamento prevenzioni il CMV
in ogni momento
ma i primi mesi di gravidanza sono quelli
di maggior importanza.



Insieme **CONTRO** *il* **CMV**

Campagna per la prevenzione dell'infezione
da Citomegalovirus (CMV) in gravidanza

**IL CMV È LA PRIMA CAUSA INFETTIVA DI SORDITÀ
E RITARDO MENTALE CONGENITO**

Poche gravide sono informate sul virus e sulle possibili conseguenze di una infezione in gravidanza.

Quando l'infezione avviene nel primo trimestre, il virus causa danni permanenti quali deficit dell'udito, della vista, motori e di apprendimento in circa il 30% dei feti infetti.

Il virus si trasmette portando alla bocca liquidi o oggetti contaminati da saliva o urine infette. La saliva e le urine dei bambini sono la sorgente principale di CMV.

Come prevenire l'infezione in gravidanza?

1

Fare il test per il CMV

2

Tenere le mani pulite e la bocca chiusa (non mettere in bocca ciò che può essere stato nella bocca di un bimbo)

3

Evitare i baci sulla bocca e sulle guance dei bambini piccoli